

SZTEhírek > Hírchívum > 2014. Június



Erdei fülesbagoly-fiókákat fogadott örökbe az SZTE JGYPK

2014. június 28.

Az SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar belső udvarának hatalmas platánfáján lévő fészekből kiesett két erdei fülesbagoly-fiókát gondoznak a kar Interaktív Természetismereti Tudástárának dolgozói az épület egyik ablakpárkányán.

Cikk nyomtatás
 Link küldés
 Tetszik 3
 Tweet



A lassan már tollasodó fiókák 2-3 hét múlva érhetik el a röpképességüket. Addig gyakran nyújtózkodnak, próbálgatják szárnyaikat, óvatosan totyognak a párkányon. Rendkívül kíváncsiak, nagy narancssárga szemekkel gyakran pislognak. Imbolyogva, nyakukat nyújtogatva figyelik a környezetükben zajló eseményeket. Fejüket akár 270 fokban képesek elfordítani. Ha megzavarják őket, szárnyaikat kissé leeresztik, tollazatukat felborzolva nagyobbak mutatják magukat. Eközben csőrüket kattogtatják, fújnak, sőt hanyatt dobva magukat éles karmaikkal csapnak az illetéketlenek felé. A kihelyezett webkamerán (www.jgypk.hu/owl (<http://www.jgypk.hu/owl>)) keresztül folyamatos meg lehet figyelni a fiókákat, azt, ahogy éjszaka a szülők enivalót visznek a kicsinyeknek.

Erdei fülesbagoly (Asio otus)

A leggyakoribb hazai bagolyfajunk. Közepes termetű, testtömege 30 dkg körüli, szárnyának fesztávolsága elérheti az 1 métert is. Szürkésbarna tollazata kiválóan elrejtja a fák lombzatában. Röpte nesztelen, könnyed. Fején tollfüleket visel, amelyeknek nincs szerepe a hallásban, annál inkább árulkodik a bagoly pillanatnyi hangulatáról. Miután nem épít, varjak, szarkák fészkeit foglalja el. Ezek hiányában faodvakban, mesterséges fészkekben, jelen esetben az SZTE Interaktív Természetismereti Tudástár udvari platánfájára kihelyezett költőládában is szívesen költ. Általában 5-6 tojást rak, és miután az első tojás lerakása után már megkezdje a kotlást, a fiókák eltérő időben kelnek ki, így különböző fejlettségűek. Teljes röpképességük elérése előtt, kb. 20-24 napos korukban szétmászálnak a fészkek körüli ágakra, és jellegzetes messze hangzó sivitó hívó hangon kérik szüleiktől az eleséget. Elsősorban rágcsálókat, ezen belül is főleg pockokat zsákmányol, emellett egerekkel is táplálkozik. A fiókáik is egészben nyelik le a szülők által hozott állatokat. A bagolyokra jellemző a „köpetelés”, amely során a madarak a zsákmányállatok emészthetetlen maradványait (például szőrt, tollat, csontokat) hosszúkás gombócok formájában visszaöklendezik. Megérdemlik a védelmet, az erdei fülesbagoly természetvédelmi eszmei értéke 50 000 forint.



SZTEinfo

Fotó: Balogh Ramóna

Forrás: SZTE JGYPK (<http://www.jgypk.hu/?p=8672>)

Cikk nyomtatás
 Link küldés
 Tetszik 3
 Tweet

Kövess minket!

Szegedi E...
 4,1 ezer kedvelés

Tetszik az oldal

Az ismerőseid közül te lehetsz az első, akinek ez tetszik.

