

[Menü](#)Szeptember 15. kedd, **Enikő, Melitta**

- [Rovatok](#)
  - [Szegeden Szeged300 Kék hírek](#)  
[Ziccer Múvház](#)  
[Túl a városon Színes](#)

- [Képriport](#)
- [Szeged TV](#)
- [Szegedi Tükör](#)
- [Városunkról](#)

- **Szegedieknek**

[E-ügyintézés](#) [E-közgyűlés](#) [Fejlesztéseink](#) [Gépjármű elszállítás](#)

**Turistáknak**

[Látnivalók](#) [Programok](#) [Szálláshelyek](#) [Menetrend](#)

**Befektetőknek**

[Fejlesztési stratégia](#) [Infrastruktúra](#) [Munkaerőpiac](#) [Építési szabályzat](#)

**Önkormányzati cégek**

[IH Rendezvényközpont](#) [Belvárosi Mozi](#) [Szegedi Partfürdő D2](#) [Szegedi Közlekedési Kft.](#) [Szegedi Környezetgazdálkodási Nkft.](#) [Szeged Tourinform](#)  
[IKV RITEK Zrt.](#) [Szegedi Víziközmű Működtető és Fejlesztő Zrt.](#) [Szegedi Városkép- és Piac Kft.](#) [Szeged Pólus](#)  
[Szegedi Sport és Fürdők](#) [Szegedi Vadaspark](#)

- [Archívum](#)
- [Kezdőlap](#)
- [Hírek](#)
- [Szegeden](#)
- Szegedi kutatók: öngyilkosságok is elkerülhetők, ha korán felismerik a gyerekkori depressziót

Megosztás 6 [Szegeden](#) 2020. szeptember 14. 20:26

## Szegedi kutatók: öngyilkosságok is elkerülhetők, ha korán felismerik a gyerekkori depressziót



Több mint két évtizede zajlik az SZTE és a Pittsburgh-i Egyetem kutatási programja a témában.

A colorful advertisement for a parking pass. The background is blue with illustrations of a yellow car, a green car, and a cartoon boy with glasses holding a pencil. There are also some autumn leaves scattered around. The text is in white and green. A green price tag shows the price in Hungarian Forint (Ft).

**PARKOLÓBÉRLET**  
BÖLCSŐDÉK, ÓVODÁK  
ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLÁK  
ELŐTTI IDEIGLENES  
PARKOLÁSRA

Ára:  
**2 610 Ft**

szkt.hu

# MENETREND VÁLTOZÁS SZEPTEMBER 1-TŐL

Járataink 2020. szeptember 01.  
üzemkezdettől „Tanév tartama alatti”  
menetrend szerint közlekednek.

A minél gyorsabb terápiás ellátás érdekében fontos a gyerekek depressziós tüneteinek korai felismerése, mert a diagnosztizáltan páciensek között nagyon magas arányú az öngyilkos magatartás – állapította meg a Szegedi Tudományegyetem és a Pittsburgh-i Egyetem két évtizede zajló kutatási programja.

Az SZTE hétfői közleménye szerint a szegedi gyermekgyógyászati klinika gyermekpszichiátriai kutatócsoportja az amerikai felsőoktatási intézménnyel együttműködve 1999-ben indította el a gyermekkori depresszió rizikó tényezőit és lefolyását elemző vizsgálatát.

Az Amerikai Egészségügyi Intézet (National Institutes of Health - NIH) támogatásával folyó - európai viszonylatban is egyedülállóan nagy volumenű -, 723 magyarországi gyermek és családja bevonásával végzett komplex kutatás azt vizsgálja, hogy az érzelmszabályozási képesség, a genetikai és különböző pszichofiziológiai, valamint a környezeti tényezők, azon belül, a családi háttér és a különféle negatív életesemények hogyan befolyásolják a gyermekkorban megjelenő depresszió betegség kialakulását, lefolyását. A kutatásba bevont, az első depressziós időszak idején tíz év körüli gyermekek jelentős részét a kutatócsoport jelenleg is vizsgálja.

Kapornai Krisztina, a klinika gyermek- és ifjúságpszichiátriai osztályának vezetője kifejtette, hogy a leghosszabban követett klinikailag igazolt korai kezdetű depresszióban szenvedő 115 fiatal 22 százaléka jutott el az öngyilkossági kísérletig. Ez az arány magasabb a nemzetközi statisztikai adatoknál. Az utánkövetés - átlagosan csaknem 15 éves - ideje alatt a vizsgálatba bevont 723 fiatal közül hárman követtek el befejezett öngyilkosságot.

Kiss Enikő, a magyarországi kutatás országos koordinátora közölte, a hazai vizsgálatok is igazolták azt a tudományos ténytet, hogy a lányok sokkal gyakrabban kísérelnek meg öngyilkosságot, mint a fiúk. A hosszú távú utánkövetés során a lányok 33, a fiúk 9 százaléka kísérelte meg eldobni az életét.

A vizsgálat szerint a gyerekek 19 százalékának egyáltalán nem volt öngyilkossági tünete vagy gondolata. A legenyhébb tünet, a halál gondolatával való foglalkozás, az érintettek 80 százalékánál jelent meg. Súlyosabb tünete, az öngyilkosság gondolata a vizsgált gyerekek 70 százalékának volt, konkrét öngyilkossági tervet pedig 47 százalékuk fogalmazott meg. Az elemzések szerint az öngyilkosság kockázatát növeli, hogy a depressziós gyerekek gyakran hatástalan érzelem és hangulatszabályozó módszereket alkalmaznak, negatív érzéseiken nem tudnak úrrá lenni.

\* \* \*

**Szeged.hu – Minden, ami Szeged! [Tartson velünk a Facebookon is!](#)**

Cimkék: [gyerek](#) [gyerekek](#) [kutatás](#) [öngyilkosság](#) [Szegedi Tudományegyetem](#) [SZTE](#) [tudós](#) [tudósok](#)

**A rovat további hírei**